

# AcePharma InfantColic koncentrát 15 g

Doplňěk stravy

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Složení: enzym laktáza, silice anýzu vonného (*Pimpinella anisum* L.) 0,18 %, fenyklová silice (*Foeniculum vulgare* var. dulce) 0,18 %, máťová silice (*Mentha piperita* L.) 0,087 %, heřmáňkové silice (*Matricaria chamomilla*) 0,085 %, glycerol (E422) 99,5 %, maltodextrin

obsah 15 g

Koncentrát pro přípravu roztoku

Aplikace: pomocí kapátka

**Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento produkt užívat.**

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

**V příbalové informaci naleznete:**

1. Co je **InfantColic koncentrát 15 g** a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete **InfantColic koncentrát 15 g** užívat
3. Jak se **InfantColic koncentrát 15 g** užívá
4. Jak **InfantColic koncentrát 15 g** uchovávat
5. Upozornění
6. Ostatní

**1. Co je InfantColic koncentrát 15 g a k čemu se používá**

InfantColic je doplňěk stravy, který obsahuje enzym laktázu a bylinné extrakty. Neobsahuje cukr ani alkohol, žádné konzervační prostředky, umělé příchuti nebo umělá barviva. Enzym laktáza usnadňuje hydrolýzu, tedy rozklad laktózy. Hraje klíčovou roli při trávení mléčného cukru „laktózy“, rozštěpení na jednodušší cukry – galaktózu a glukózu. Anýz vonný, fenykl obecný, heřmánek a máta peprná přispívají k normálnímu trávení. InfantColic může být užíván od ukončeného 1. měsíce života dětmi bez lékařského předpisu.

**2. čemu musíte věnovat pozornost, než začnete InfantColic koncentrát 15 g užívat?**

Nepodávejte, pokud je dítě přecitlivělé na jakoukoliv složku v produktu. Nejste-li si jistí, konzultujte užívání s lékařem.

**3. Jak se InfantColic koncentrát 15 g užívá?**


Doplňte kojeneckou vodou po vyznačenou rysku a **před každým použitím důkladně protřepejte!!!** Použitelnost přípravku je 4 týdny od otevření a naředění. Podle dávkovací tabulky nakapejte na předem sterilizovanou lžičku nebo přímo do úst a podávejte dítěti před každým krmením. Pokud lékař nedoporučí jinak, užívá se takto:

\*ALU - laktázová jednotka (FCC)

1 - 2 měsíce	8 kapek před každým jídlem odpovídá 720 *ALU
3 - 5 měsíce	10 kapek před každým jídlem odpovídá 900 *ALU
5 - 10 měsíce	13 kapek před každým jídlem odpovídá 1170 *ALU
10 - 12 měsíce	15 kapek před každým jídlem odpovídá 1350 *ALU



Doplňte po rysku kojeneckou vodou



Důkladně protřepejte před



Aplikujte pomocí kapátka



Po otevření a naředění přípravku uchovávejte max. 4 týdny při pokojové teplotě.

**4. Jak InfantColic koncentrát 15 g uchovávat**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, suchu a nevystavujte slunečnímu záření. Po otevření a naředění přípravku uchovávejte max. 4 týdny při pokojové teplotě.

**5. UPOZORNĚNÍ**

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní doporučené dávkování. Není určeno jako náhrada pestré stravy. Nejste-li si jistí, konzultujte se svým lékařem nebo lékárníkem. Minimální trvanlivost do data uvedeného na obalu.

**6. Ostatní**

Tvrzení dle on-hold: *Foeniculum vulgare* - normální trávení, *Pimpinella anisum* - normální trávení a podporuje chuť k jídlu, *Mentha piperita* - normální činnost trávicí soustavy a stěv, *Matricaria chamomilla* - normální trávení

Energetická hodnota jedné kapky 0,33 KJ / 0,08 Kcal

**Balení:** 15 g, plastová lékovka s kapátkem

**Výrobce:** AcePharma s.r.o., Staříč 595, CZ-739 43, [www.AcePharma.cz](http://www.AcePharma.cz)